



مراقبت های کاشت ایمپلنت

۱- گاز استریل موجود روی ناحیه جراحی شده را به مدت نیم ساعت نگه دارید و از تعویض گاز استریل روی ناحیه با فواصل کوتاه تر از ۳۰ دقیقه خودداری نمایید .

۲- خونریزی و نشت خون و صورتی شدن آب دهان بعد از جراحی دهان به مدت چندین ساعت طبیعی است . از کشیدن سیگار در روزهای اول پس از جراحی خودداری نمایید ، چون باعث ایجاد افزایش خونریزی و عفونت می شود.

۳- در صورت بروز خونریزی به نحوی که در دهان لخته ایجاد شود ، یک گاز استریل روی ناحیه جراحی شده قرار دهید و سپس با قراردادن دندان یا فک روی آن حداقل به مدت نیم ساعت فشار آورید . در صورت ادامه خونریزی این عمل را تکرار نمایید . ضمناً با استفاده از کمپرس سرد روی صورت در ناحیه جراحی می تواند در کاهش خونریزی موثر باشد .

۴- تورم و درد از عوارض قابل انتظار بعد از عمل جراحی می باشد که برای تسکین درد باید از مسکن تجویز شده استفاده نمایید .

۵- استفاده از کیسه یخ روی صورت در ناحیه جراحی شده به مدت ۶-۵ ساعت بعد از جراحی در کاهش درد و تورم موثر خواهد بود . (متناوباً حدود ۲ دقیقه کیسه را گذاشته ۵ یا ۱۰ دقیقه بردارید)

۶- از رژیم غذایی نرم و مایعات سرد یا هر غذایی مقوی که قادر به خوردن آن باشید استفاده نمایید (صرفاً مایعات بعد از جراحی ضروری است)

۷- از شستشوی دهان در روز جراحی خودداری نمایید .

۸- از فردای جراحی پس از صرف غذا دهان را با آب و نمک قرقره نمایید (یک قاشق چایخوری نمک در یک لیوان آب جوش ولرم)





۹- مسواک زدن از فردای جراحی بلامانع است. فقط دقت نمایید روی ناحیه جراحی مسواک زده نشود .

۱۰- بعد از جراحی دهان ، قشرخاکستری رنگی روی زخم را می پوشاند و دهان بدبود می شود که این علائم، نشانه های عفونت نیستند .

پس از عمل جراحی داروها برای ۵ روز اول تجویز شده است .

۱- کپسول آموکسی سیلین ۵۰mg (هر ۸ ساعت یک عدد)

۲- قرص مترونیدازول ۲۵۰mg (هر ۸ ساعت یک عدد)

۳- آمپول دگزامتازون ۸۰mg (بلافاصله بعد از جراحی)

۴- شیاف دیکوفناک در موقع درد

